Enfariné noir

Vass8R09s141-145

Wtp337

Collection Vassal-Montpellier

dintindintindentialantal

En farme non Cl8R9 5141-145

non, legrellijr majen å grus







Juntandania da kara

ndicatan landara bandara bandara bah

ANNEE 1987 NOM Enfarine nou EMPLACEMENT 8 R9 A MAI. 145 Nore Débourrement Nhre Ferti-Floraison Véraison début mi/v fin Souche yeux début mi/déb grap lité Maturité 7,4 31,3 4 27.3 31.3 5,6 No.6 15,6 6.8 10.8 13.8 21.987 +3 31.3 7.4 6 4 £7.3 31,3 5 31.3 22

diatainambatanlaatad

Juntonihinite adamenden

ANNEE 1988
NOM Enfarine ne EMPLACEMENT (R9 s 141-145

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f			raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	3	28.3 21.3 21.3	25.3	0 2 3 0 5	7	3(.5	36	66	4.8	8.8	12.8	12.9
			28,3 +4 ure: (		ort : <sup>M</sup>		3,6 +3 Vigu	eur :	2 faible	+3		+4

ANNEE 1989 NOM Enfarmé N

luntumlumi adama dama da

EMPLACEMENT 8 Rg & 141-145

diataidantaidantaidataid

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb				oraiso mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
			203-									
2 }	2 4 2	20 3 20 3 20 3	23 3 × 13 3 ·	2 4 3	12	24.5	265	305	31,7	7,8	16,8	.U.9 +5
2 8 3 2 70 3 23 3 2 12 4 4 70 3 13 3 4 5 2 20 3 23 3 3 3 Pourriture: 0 Mill.: 0						Port	en	igi'	Viç	gueur	: 2,5	

N° d'ordre :

Juntanlanta

Désignation: Enfarine moir Emplacement: el 8 Rg s/41-145 (s.145)

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198).

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

dantaglasteedmaandantuul

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280/ - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune (09) - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (28) sans villosité laineuse (83).

Limbe : glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse (285.)

A limbe plah - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

## Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 230 séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 23 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Enfariné moir 8 R 9 s. 141-145 (s. 145)

Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 289 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies (49 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies (5) - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte (60) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert (65)

## (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation :

Juntanlanta

Enfaire noir 8 R9 s- 141-145 (s.145)

daatadaateebuutuuluutuul

Emplacement :

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux (45 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente (72) - sans villosité laineuse 273,

> limbe: glabre 150 - séteux 161) - velouté 152 aranéeux (5) duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 sans villosité laineuse 275

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire (16).

Nervures : Face supérieure : verte (63 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 2/17. partiellement - totalement.

Calvo 86

Enfariné nour clos 8 R 9 s 141-145 (6.145) Désignation : Emplacement: GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) Petite 3. (dimensions: 15x 24 - Lâche 4 - Noyenne 5 - Compacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6. BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 19 × 18). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 50 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1 / coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutro () fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 / apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent (2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Juntanlanta

Nº d'ordre :

Calvo85

duntanlanimhentudududud

Enfarine moir 8 Rg s 141. 145 (3.3)

Juntandanta

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifis (1) - peu ramifie (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mārithalle de longueur moyenne : ......40.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (1).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation: Enfarine noir Emplacement : 8R9S 141-145 : 1 - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - 41 Dents : forme : (42) - (43) - 44 . Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> = 60 - 61 - 62: (63) - 64 - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Juntanlanta